



## Servei Assistencial de Salut Vacunacions sistemàtiques

### VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

Adreçada a tota la població universitària, especialment a aquelles persones que tinguin un alt risc de patir complicacions relacionades amb la grip. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recomana la vacunació a:

- Persones a partir de 60 anys o més.
- Dones embarassades (a partir del 2n trimestre d'embaràs)
- Persones amb malalties cròniques.
- Persones amb obesitat mòrbida.
- Cuidadors de persones que pertanyen a qualsevol dels col·lectius esmentats.
- Persones que fan serveis essencials per a la comunitat.

Consta d'una sola dosi i l'efecte protector dura aproximadament sis mesos.

**El període d'administració l'estableix cada any el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.**

### VACUNACIÓ ANTITETÀNICA/ANTIDIFTÈRICA

Adreçada a tota la població universitària, independentment de la seva activitat laboral o d'estudis.

Les lesions a la pell (ferides, cremades, mossegades, etc.) poden ser la porta d'entrada del bacil tetànic. Per tant, tothom està exposat al tètan.

Si la vacunació està actualitzada, les dosis de record seran als 40 i als 65 anys.

Durant la gestació s'ha d'administrar, si cal, durant el segon trimestre de l'embaràs.

### VACUNACIÓ ANTIHEPATITIS B

Adreçada a la població universitària considerada amb risc laboral d'exposició al virus de l'hepatitis B, en concret a les persones que, pels seus estudis, investigacions o treball habitual manipulin sang i/o altres fluids humans (saliva, llàgrimes, esperma, flux vaginal).

Consta de tres dosis: a l'inici, al cap d'un mes i als sis mesos després de la primera dosi. Actualment se suposa que l'efecte de protecció és superior als deu anys. Cal valorar individualment pel que fa a l'administració de dosis posteriors, per a mantenir-ne l'efecte.

Les embarassades poden rebre la vacuna en qualsevol moment de la gestació.

Davant d'una exposició accidental a través de pell i/o mucoses amb sang i o altres fluids humans, acudiu al Servei Assistencial de Salut per iniciar, si cal, la profilaxi postexposició.

### VACUNACIÓ ANTIHEPATITIS A

Adreçada a la població universitària considerada amb risc laboral d'exposició al virus de l'hepatitis A, en concret, a les persones que pels, seus estudis, investigacions o treball habitual manipulin aigües residuals no depurades o productes potencialment contagiosos (mostres d'origen fecal humà).

Consta de dues dosis separades per un interval de sis a dotze mesos. No s'ha establert recomanacions sobre la necessitat eventual d'una dosi de record.

#### Horari d'administració de vacunes:

**De dilluns a divendres, de les 9:00h fins a les 13:00h i de les 15:00h fins a les 19:30h**

Si teniu el carnet de vacunacions, revisarem el vostre cas. En cas de cap dubte, ens el podeu consultar